

卷十三

吉慶堂



BGA2936

U. T.

濟陰綱目卷之十三

關中 武之望叔卿父輯著 白猷 趙文燧子恒氏訂正

西陵 汪 淇瞻子箋釋 天都 查 望千周父叅閱

產後下

虛煩

凡產後血虛
氣無所附則
逆而為火火
上逆而瘀血

大全云餘血奔心蓋是分解了。不便與童子小便并辭心下及臥
太速。兼食不相宜之物所致。但能依方療之。無不痊可。

迫之則心煩
矣。童便濁陰
也。其味苦鹹

薛氏曰四物湯加茯神遠志治產後虛煩十全大補湯尤効論見
發熱條

寒其性就下
降火消瘀故
宜服之所謂
燭陰出下厥

陳氏曰尋常治諸虛煩熱者以竹葉石膏湯溫膽湯殊不知產後
與尋常不同如石膏等藥不宜輕用用之必死

也。

蒲黃生用性

涼逐瘀桂心

去皮性熱行

血烏梅酸收

滌汚用此方

不可忘此法

前方以熱行

血此方以涼

行血集方者

淫澀自分用

方者毋得朱

與不辨

此方行氣行

血不熱不寒

較前方是一

天露色令人

心朗神治

金黃散。

治產後惡血衝心時發煩躁。

玄胡索

蒲黃

各半 桂心二錢半

右為細末烏梅煎湯調下二錢。

荷葉散。

療產後七日內宿血不散時時衝心迷悶。

荷葉

一兩七錢半

延胡索二兩

地黃汁二合

右用水二升煮二味取六合下延胡索分三服空心服忌肉食

一日。

川芎散。

療產後餘血不盡奔上衝心煩悶腹痛。

川芎

生乾地黃

白芍

枳殼各等分

右為末酒調方寸七日二服。

集驗方。

產後血氣煩悶。

生地黃汁

清酒升

此方清新聞切

生地黄汁

清酒各一升

右二味相和煎一沸分為兩服

經効方。療產後氣虛冷搏於血。血氣結滯。上衝心腹脹滿。

當歸

川芎

桂心

吳茱萸

陳皮

生薑各兩

白芍二兩

右以水三升。煮取一升。去滓空心服。

沒藥丸。治產後心胸煩躁。惡血不快。

沒藥

蠻薑

延胡索

當歸

乾漆炒

桂心

牛膝

牡丹皮

乾薑各等分

右為細末。醋煮麴糊丸。如桐子大。煎麴湯下十九至十五丸。

治血氣煩悶雜方。

以上諸方看一方有一方妙用細玩之真如山陰道上行令人不忍捨去。讀治症語便知用藥宜溫所謂寒者熱之留者行之也。以煩躁二字似不宜用熱藥。問到惡血不快便是瘀血衝心而如此溫行破血之藥必不可。

少者也。又寫
治熱煩而不
用熱藥哉。

連讀數方各
呈如相如化
工夫巧有難

描此數方又有
痰涎濃抹之
致。

藕汁竹瀝雖俱
治煩然清火則

同而破血消痰
則異宜別之如

陳白梅蒲黃尖
笑散入皆能之
而羊胆之用誠

有回天之力造
方有集方皆均

生藕汁飲二升。効竹瀝亦得。

一方陳白梅槌碎煎湯飲。

一方用蒲黃隔紙炒每服一錢東流水煎湯下。

用矢笑散亦佳。

一方療產後餘血攻心或下血不止心悶面青冷氣欲絕用羊血

一盞頓服。若不定更服立効。

○已上治餘血奔心之劑。

人參當歸湯。治產後去血過多血虛則陰虛陰虛生內濕以致

心煩短氣自汗頭痛。

人參 當歸 熟地黄 麥門冬 肉桂

白芍藥 炒二錢半

去心 各二錢

右用水一鍾梗米一合竹葉十片煎至一鍾食遠服○血熱甚

煩德無清矣

此方以四物去

川芎置散氣

也用肉桂助其

止汗也但與象

藥等分亦須斷

酌而以粳米竹

葉加之治心煩

短氣之良法矣

血熱加生地尤

佳如肉桂所當

去也

此方以小麥補

心麥雨竹葉除

煩甘草大棗益

氣安其字併培

其母亦良法也

生薑佐之更有

營養之力而自

右用水二鍾粳米一合竹葉十片煎至一鍾食遠服○血熱甚

者加生地黃二錢○

竹葉湯○治產後短氣欲絕心口煩悶○

竹葉切麥門冬去小麥各甘草各一生薑二

大棗十二

右切以水一斗煮竹葉小麥至八升去渣納餘藥煮取三升去

渣溫服○虛悸加入參二兩○小氣力加糯米五合○

甘竹茹湯○治產後內虛煩熱短氣○

甘竹茹升人參麥門冬去茯苓甘草各一黃芩三

右咬咀以水六升煮取二升去渣分三服日三

薤白湯○治產後胸中煩熱逆氣○

虛憊如參多
益善糯米用之

為小力之助多
養陰也

此治虛煩氣
神方雖品味效

少而藥力精專
可法可法

如黃芩又可去
取者也

此治胸痺注之
夜也方出

仲景薤白半夏
所以治逆氣痞

薤積麥所以
治煩熱參甘

草補虛知母石
膏之加非熱甚

不用益為血虛
所益故也

薤白

半夏

人參

甘草

各一兩

括蕒根

二兩

麥門冬

半斤

熱甚加知母石膏

右咬咀以水一斗三升煮取四升去滓分五服日三夜二

芍藥梔豉湯

治產後虛煩不得眠

白芍

當歸

梔子

香豉

半合

右用水二鍾半先煮前三味得二鍾內香豉煮取一鍾半去滓

分二服溫服

此雖雲岐法不若仲景酸棗湯穩當

○以上治血氣虛煩之劑

仲景二物黃芩湯婦人在草褥自發露得風四肢苦煩熱頭痛

者與小柴胡湯頭不痛但煩者此湯主之

黃芩

一兩

苦參

二兩

乾地黄

四兩

右三味以水八升煮取二升溫服一升多吐下蟲

仲景治傷寒虛煩

煩眠有欬子

鼓湯而此如白

芍當歸者乃雲

岐案傷寒法以

治產後也入常

謂傷寒方可通

於雜有是哉

要在風字上看

以煩痛不痛為

法

此大苦寒之劑

齊與後其意

宜意病成煩與

要以前煩三字

上體貼

中虛症不可用

至膏煩亂症不

可用桂枝而此

右三味以水八升煮取二升溫服一升多吐下蟲

竹皮大丸

治婦人產後中虛煩亂嘔逆安中益氣

生竹茹

石膏各二

桂枝

白薇各一

甘草七

右五味為末。棗肉和丸如彈子大以飲服一九日三夜二服

有熱倍白薇。煩喘加栝實一分。

○已上治中風煩熱之劑。

經驗方

治產後煩躁此重可去怯之義

禹餘糧一枚狀如酸餡者人地埋一半四面緊築用炭一秤

發頂火一斤煨去火三分耗二為度用濕土覆一宿方取出

打去外面一層只用裏內細研水淘澄五七度將紙襯乾再

研數于遍用甘草湯調二錢七只一服立効

齊食綱目

卷十三虛煩

四

方以甘草七分

配藥六分

以重而為丸仍

以三九飲下可

想覺其立方之

易用藥之確審

如是之不易也

凡飲服者尤慮

去虛虛之禍耳

用是方者亦當

深省

若謂去血過多

而用重便以治

虛火是全用

四物治虛則可

萬之物能不升

散乎以胃氣虛

而渴用白朮宜

矣而人血虛用

白朮故是也

發渴

熊氏曰產後心煩發渴宜清心蓮子飲

薛氏曰前證若出血過多虛火土炎用童子小便或四物白朮麥

門丹皮若胃氣虛而有熱用竹葉歸芪湯若血虛發熱用八珍加

麥門五味若血脫發熱煩躁用當歸補血湯若胃氣虛弱用補中

益氣湯或七味白朮散

一產婦患前證朝寒暮熱肚腹作痛以手按之不痛余以為血氣

俱虛用八珍之類治之彼反行逐血更加發熱煩躁余用當歸補

血湯熱躁漸止用八珍麥門五味氣血漸復

李氏曰產後煩渴氣虛者生脉散血虛者四物湯加天花粉麥門

冬氣血俱虛作渴頭眩脚弱飲食無味者用人參三錢麥門冬一

者乃用此方錢半熟地黃七分天竹化粉二錢甘草五分糯米薑棗煎服

必血虛胃氣弱
者乃可證用
藥幸毋執
此方分兩有法
讀者可輕放
過

直入以天
心為心故其方
亦以雲行雨施
之道渴致此方
以治渴補虛之
藥十分為君而
又以淡滲燥血
生津之藥十之
一分為使佐此
何為也蓋以茯
苓能降天之陰
氣生發地之
陽氣脾者土也
天氣通於地地

錢半熟地黃七分天花粉三錢甘草五分糯米薑棗煎服

千金竹葉湯 療產後虛渴少氣力

竹葉三升 人參 茯苓 甘草各一兩 小麥五合

麥門冬五兩 半夏 生薑各三兩 大棗十五枚

右咬咀以水九升先煮竹葉小麥薑棗取七升去滓入餘藥再

煎取二升每服五合日三夜一

竹葉歸耆湯 治胃氣虛熱口乾作渴惡冷飲食者

竹葉一錢 黃耆二錢 人參 白朮 當歸各錢

麥門冬去心七分 甘草炙五分

右剉水煎服

熟地黃湯 治產後虛渴不止少氣脚弱眼眩飲食無味

承天氣而施生
故佐養束發脾

氣以通雍陽而

生津經曰氣和

而生津液相成

神乃自生此大

意也直入素有

一体同仁之教

豈知半夏茯苓

苓之過而反用

之歟後之學者

效之去之各存

平其大焉

少用地黃多用

人參便是妙法

自糯米養陰白

自治中氣虛弱

以致津液短少

者宜之蓋為已

熟地黃

酒洗一錢半

人參

麥門冬

去心各二錢

括蕁根

四錢

甘草

炙五分

右咬咀作一服加糯米一撮生薑三片棗二枚水煎服

七味白朮散

治中氣虛弱津液短少口乾作渴或因吐瀉所致

人參

白朮

白茯苓

甘草

藿香

木香

乾葛

右剉一服水煎服

清心蓮子飲

治產後心煩發渴

麥門冬

黃芩

地骨皮

車前子

甘草

炙各一錢半

人參

黃蓍

白茯苓

石蓮肉

各七分半

一方加遠志石菖蒲

各一錢

右另用麥門冬二十粒水二鍾煎一盞水中加冷空溫服

千脾也乾葛木
香薑皆發脾
氣而不香於小
更更宜於產後
須量可
方各清心理宜
保肺以生水道
亦以瀉火也故
諸藥性能知其
理
用遠走若胃滿
以治煩熱有未
當處
大渴妙藥亦有
補土生金之理

右另用麥門冬二十粒水二鍾煎一盞水中宜冷空心溫服
發熱加柴胡薄荷

產寶方 療產後大渴不止

蘆根切一升 麥門冬生四兩 瓜蔓根 人參 茯苓

甘草各三兩 大棗二十枚

右以水九升煮取三升分三服頓服四劑即瘥忌葷菜

括蔓根湯 療產後血渴

括蔓根四兩 麥門冬去心 人參各三兩 生乾地黄 甘草各二兩

土瓜根五兩 大棗二十枚

右咬咀以水八升煮取二升半分三服

黃芩散 治產後血渴飲水不止

齊雲圃目 卷十三發渴

証亦相宜

黃芩

麥門冬各等分

右咬咀每服三錢水一盞煎八分溫服無時

原東坦治脫血方也移之

當歸補血湯

治產後血脫煩躁引飲晝夜不息脉洪大而虛重

以治產後煩渴非有見者不能

按全無者

當歸二錢

黃芩炙一兩

右剉作一服水煎服

二方

療血渴及產後渴

用蓮子心取為細末米飲調下二錢効

一方

治產後出血太多虛煩發渴

用真正蒲黃末二錢白湯調下如渴燥甚并花水下

一方

治產後中風煩渴

以下二方一清心一涼血一生血如一山一水一琴一雀各得其趣

用紅花子五合微炒研碎以水煎濃徐徐呷之

丹出於鉛內。含真水且以鎮。墜淳火故能止。渴而石底最為。燥烈之物何以。用之而況以產。後乎曰不煩而。渴時用井水調。下一錢須當究。其故也。大汗者陽之氣。陰氣不復則陽。無所歸以大於。陰故虛陽上浮。於外而為汗耳。若當為汗多成。痙而大言因而。遇風痙之理。

用紅花子五合微炒研碎以水煎濃徐徐呷之。

桃花散。治產後不煩而渴。

新石灰一兩 黃丹五錢

右為細末渴時用井水調下一錢。

○自汗

大全云產後虛汗不止者由陰氣虛而陽氣加之裏虛表實陽氣獨發於外故汗出也血為陰產則傷血是為陰氣虛也氣為陽其氣實者陽加於陰故令汗出而陰氣虛弱不復者則汗出不止也凡產後血氣皆虛故多汗因之遇風則變成痙縱不成痙亦虛之短氣身體柴瘦唇口乾燥久則經水斷絕由津液竭故也。

薛氏曰按前証屬血氣俱虛急用十全大補湯如不應用參附著。

又不成瘕而短
氣柴瘦者此痰
熱也省之省之

亡陽發瘕用十
全大補參附芪

附之類心氣血
俱虛而用母泛

泛耗以為是也
而額汗當分部

位以近于迂臨
症宜評悉蓋

腎後入心為汗
於理須究

其始也妙在易
九少其繼也宜

六劑湯煎服

附等湯若汗多亡陽發瘕尤當用前藥王海藏先生云頭汗出至
頸而還額上偏多蓋額為六陽之所會也由虛熱熏蒸而出竊謂
前證當以部位分之額左屬肝額右屬肺鼻屬脾頤屬腎額屬心
治者審之

一產婦略聞音響其汗如雨而昏潰諸藥到口即嘔余以為脾胃
虛敗用參附末為細丸時含三五粒隨液嚥下乃漸加至錢許却
服參附湯而痊

一產婦盜汗不止遂致廢寢神思疲甚口乾引飲余謂血虛有熱
用當歸補血湯以代茶又以當歸六黃湯內黃芩蓮棗炒黑倍加
人參五味子二劑而愈

大全云凡產後忽冒悶汗出不識人治用鷄子及竹瀝
二法見前血暈

前論汗出因風交瘕之論居優不然謂之脫壤矣此大法所當施也

葛得防風其節大為易于

裏也而黃芪

二錢防風五分

大約是矣牡蠣

腎家藥也以腎

液入心為汗故

止汗又宜曰腎

其也可意解矣

麻黃氣悍而輕

陽藥也由其根

用且陽中之陰

薛氏曰前說屬大虛宜固元氣為主其汗不止必變柔瘕東垣先

生云婦人分娩及半產漏下昏冒目瞋蓋因血暴亡而火上熾但

補其血則神自安若常時血下當補而升舉其氣陽得血而神安

則目明矣今立一方以補手足厥陰之血兼益陽氣名曰全生活

血湯

黃耆湯

治產後虛汗不止

黃耆二錢

白朮

防風

熟地黃

牡蠣煅為粉

白茯苓

麥門冬去心

甘草炙各五分

右切作三服加大棗一枚水煎服

麻黃根散

治產後虛汗不止

當歸

黃耆炒

麻黃根

牡蠣粉

耳非從陽引陰
歸根之意要

人參

甘草

炙各等分

知用藥自有至理

右劉每服四錢水煎服

小麥麴陽至

止汗散

治產後盜汗不止一應汗多者皆可服

成于陰至內陽而外陰也今用

牡蠣

煅成粉

小麥麴

炒合黃色碾成粉各等分

中陰耳且汗為

右和勻煮生豬肉汁調下二錢無時

心液而小麥入

當歸二黃湯

治產後自汗盜汗胃氣虛弱服別藥則嘔吐不能

心用其麴液

當歸

黃芩

各一兩

麻黃根

半兩

入心為汗而猪

右咬咀每服三錢水煎服

一方無麻黃根用白芍藥

汁能又歸之

當歸六黃湯

治血氣虛熱盜汗不止

腎平服無時看

當歸

黃耆

炒

熟地黃

各一錢

生地黃

黃蘗

炒

遲宜頻服多服

黃芩

炒

黃連

炒黑各一錢

麻黃根引陽歸

黃芩

炒黑

黃連

一錢

有水煎服○不應加入參白朮○心血不足加酸棗仁

陰固其性也。自
地藥而肝陰陰
里其酸也。當歸
黃芪原自補血
陽之藥。陳思見
從本方立法。以
黃芪為君者。得
正也。
陽加於陰。謂之
汗。陰加於陽之
藥。而反治之。則
汗自去矣。方
大意如此。所謂
此者。正治也。如
此方以氣血為
主。而引經之妙
在道。易。糯米
去陰。意自發散
何為用之。然上
不以留下。不以

有水煎服。不應加入參白朮。心血不足。加酸棗仁。

人參湯。治產後諸虛不足。發熱盜汗。

人參 當歸各等分

右為末。以猪腰子一隻。去脂膜。切小片子。以水三升。糯米半合。葱白兩條。煮米熟。取清汁一盞。入藥二錢。煎至八分。溫服。不拘時。

參附湯。治陽氣虛寒。自汗惡寒。或手足逆冷。大便自利。或臍腹疼痛。吃逆不食。或汗多發瘧等証。

人參 一兩 附子 炮五錢

右作一服。加薑棗水煎。徐徐服。

蒼附湯。治陽氣虛脫。惡寒自汗。或口噤痰湧。四肢逆冷。或吐瀉。

漏發白重

用而又熱之於

水又非引陰

平噫者深思焉

此無王救急神

方乃回陽返水

之道權四肢厥

冷汗出如雨者

宜之

二方用參

畏畏固表氣

一補裏氣自是

否用藥者當

於此探審其內

外有無而求責

焉庶幾道真所

謂有者求之無

者求之也至哉

腹痛飲食不入及一切虛寒等證

黃耆一兩

附子炮五錢

右作一劑加薑棗水煎服如不應倍加附子方得全濟

千金方療產後風虛汗出小便短少四肢拘急難以屈伸

甘草兩

附子炮

桂心

芍藥炒各一兩半

右剉每服三錢加生薑四片棗一枚水煎服忌猪肉冷水生葱

等物

全生活血湯治產後冒悶發熱自汗盜汗自晝晝四肢無力口

乾頭暈行步欹側

升麻

芍藥炒各二錢

當歸

柴胡

防風

羌活

獨活

葛根

甘草炒各一錢

川芎

風加附子以酒

藥本五分

生地

熟地黃錢

細辛

省之也至哉
羌活
萬應二錢
甘草
妙絡川芎

用桂枝湯以治

藁本各五分

生地

熟地黃各一錢

細辛

風加附子以治

蔓荊子各五分

紅花二分

虛即桂枝加附

右剉每服五錢水煎服

子湯也乃仲景

發熱

法以四肢拘急

薛氏曰產後虛煩發熱乃陽隨陰散氣血俱虛若惡寒發熱煩躁

故用此方不然

作渴急用十全大補湯若熱愈甚急加桂附若作渴面赤宜用當

此方以風升之

歸補血湯若誤認為火證投以涼劑禍在反掌王太僕先生云如

汗誰其信之密

大寒而甚熱之不熱是無火也熱來復去晝見夜伏夜發晝止不

益陽焉蓋問曰

時而熱是無火也當治其心如大熱而甚寒之不寒是無水也熱

陰者從陽而亟

動復止倏忽往來時動時止是無水也當助其腎故心盛則生熱

起也陰不從陽

腎盛則生寒腎虛則寒動於中心虛則熱收於內又熱不勝寒是

則陽外散故多

腎盛則生寒腎虛則寒動於中心虛則熱收於內又熱不勝寒是

十

地黃退熱獨活

升太陰之氣于

前蔓荊子涼諸

經之血其草和

諸陽之氣四物

寒血于諸陰之

經紅花和血于

諸陽之絡然則

升而不飲非所

以藏陰故用白

芍藥君升而太

過非所以益氣

故用甘草為佐

言雖如此誰敢

用也視其自置

思發執口乾頭

暈行步欲側皆

邪客經絡也以

邪客經絡兩者

不和熱為自汗

漢陽雜錄

卷一

一

無火也。寒不勝熱。是無水也。治法無水者。六味丸。無火者。八味丸。

氣血俱虛者。八珍湯與十全大補湯。

大尹俞君之內產。後發熱。嘔吐。吐血。便血。兼盜汗。小便頻數。胸脇

脹痛。肚腹痞悶。余曰。此諸臟虛損也。治當固本為善。自恃知醫。用

降火之劑。更加瀉痢。腸鳴。嘔吐。不食。腹痛。足冷。始信余言。診其脉

或浮洪。或沉細。或如無。其面或青黃。或赤白。此虛寒假熱之狀。時

值仲夏。當捨時從證。先用六君子湯。加炮薑。肉桂。數劑。胃氣漸復。

諸證漸退。更作以十全大補湯。半載全愈。

儒者楊敬之內人。所患同前。但唾痰涎。或用溫補。化痰之劑。不應。

面色黧黑。兩尺浮大。按之微細。此因命門火虛。不能生脾土。脾土

不能生諸臟。而為患也。用八味丸。補土之母。而痊。

婦產後三日。起早。覺氣血未定。則身熱。目暗。如前。則以...

盜汗之症以此
方和之則外者
得入內者得出
使經路通邪氣
散陰陽和為骨
用矣而安有以
上症也
妙在以胃氣為
主
清魂散乃散風
之補劑
以此觀之原有
外感
既知內熱生風
只宜治熱不必
治風所謂來標
取本也即三
和散或桃仁承
氣湯俱妙三和
散有奎黃

一婦產後三日起早。况氣血未定。遂感身熱。目暗如風狀。即以清
魂散二服。得微汗而愈。

滑伯仁治一產婦惡露不行。臍腹痛。頭疼寒熱。眾皆以為感寒。溫
以薑附益大熱。手足摘擲。詔譴目攢。診其脉弦而洪數。而赤目閉。
語喃喃不可辯。舌黑如焰。燥無津潤。胸腹按之不勝手。蓋燥劑搏
其血內熱而風生。血畜而為痛也。曰此產後執入血室。因而生風。
即先為清熱降火。治風涼血之劑兩服。頗爽。繼以琥珀牛黃等。稍
解人事。後以張從政三和散行血破瘀。三四服惡露大下如初時。
產已十日矣。于是諸證悉平。

一婦盛暑月中產三日。發熱其脉虛疾。而大惡露不行。敗血攻心。
狂言叫呼奔走。拏捉不住。以乾荷葉生地黃牡丹皮濃煎湯調下。

此敗血之劑其
不用大黃者以
脈虛大也

以此脈認到涼
藥所致而致以
陰盛格陽也以
搏指之脈用參
蒼蓋不必其脈
堅強搏手而無
陽以和之也豈
有用附子者不
可不知
石山先生長厚
君子而老於醫
者也其言必不
誣然初學不知
寔難下手而況
受補之

生蒲黃二錢一服即定惡露旋下而安

一婦產後時發昏瞶身熱汗多眩暈口渴或時頭痛惡心醫用四
物涼血之劑病不減又用小柴胡病益甚石山至診得脈浮洪傳
指汪曰產後而得是脈又且汗多而脈不為汗衰法在不治所幸
者不喘不泄耳其脈如是蓋涼藥所激也用人參三錢黃耆二錢
甘草當歸各七分白木門冬各一錢乾薑陳皮黃芩各五分煎服
五劑脈歛病漸安

壬僉憲宜人產後因沐浴發熱嘔惡渴欲飲冷水瓜果譫語狂
飲食不進體素豐厚不受補醫用清涼之劑熱增甚診得六脈浮
大洪數汪曰產後暴損氣血孤陽外浮內真寒而外假熱宜大補
氣血與八珍湯加炮薑八分熱減大半病人自以素不宜參耆不

八子須要膽大
心乃能濟事
不然弗妄為也

快甚快甚

古人於血証中

每每用乾薑而

今人率用炮薑

則孰是而孰非

也若謂入肺則

宜乾薑入肝則

宜炮薑入脾溫

中則宜炮薑以

其有守有走有

從之不同也今

用炮薑須炮得

十分極黑為妙

宜再服過一日復大熱如火復與前劑潛加參耆炮薑連進一二服熱退身涼而愈

丹溪曰產後發熱用參耆黃芪陳皮當歸川芎炙甘草補虛輕則

加茯苓淡滲之其熱自除重則加乾薑或云大熱而用乾薑何也

曰此熱非有餘之邪熱乃陰虛生內熱耳蓋乾薑能入肺分利肺

氣又能入肝分引眾藥生血然不可獨用必與補陰血藥同用此

造化自然之妙非天下之至神其孰能與於此耶

王節齋云凡婦人產後陰血虛陽無所依而浮散於外故多發熱

治法用四物湯補陰血而以炙乾薑之苦溫從治收其浮散使歸

依於陰然產後脾胃虛多有過食飲食傷滯而發熱誤作血虛則

不効矣但遇產後發熱者須審問食何飲食有無傷積若有胸膈

飽悶噯氣惡食泄瀉等證只作傷食治之若發熱而飲食自調者方用補血正法。

丹溪方。

治產後發熱。

當歸

川芎

黃耆

人參

白朮

白茯苓

各一錢

甘草

炙五分

右剉水煎服。

熱甚加乾薑。

加味四物湯。

治產後陰虛血弱發熱。

當歸

川芎

白芍

熟地黃

白茯苓

各一錢

右水煎服。

熱甚加炒乾薑。虛煩加茯神遠志。

抽薪散。

治產後血虛發熱。

當歸

熟地黃

各四錢

乾薑

炒黑一錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

此方全不用氣藥是而虛而氣不虛飲食善用者也加茯苓者使天氣隆而陰自生陰生則自止也其甚加

此以佛手散公四君加黃芪而不用芍藥地黃者以新產之後宜用血脫蓋氣之法不宜歛臟以伐生氣也此方於氣血俱虛及氣虛者皆宜之

炒姜則不惟從陽引陰亦可從陰引陽也微乎微乎此又前方之變內不用芍药又是法當在肝腎上求之此方用參歸為氣血之主而用以熟地麥門肉桂白芍梗米竹葉煎服如血熱甚者加生地此與前方逍遙散不同又與立齋所用加味道遙散亦不同此即以小柴胡湯合四物生脉散

右劉一劑水煎服

人參散 治產後諸虛不足發熱盜汗

方見前自汗

人參當歸散 治產後去血過多血虛則陰虛陰虛生內熱令

人心煩短氣自汗頭痛

方見前虛煩

加味道遙散 治產後發熱口乾作渴唇裂生瘡

當歸

白芍

乾葛各一錢

生地黃

川芎

黃芩

各錢半

柴胡一錢

人參

麥門冬

各凡分

烏梅一個

甘草

六分

右劉散分作二服用水一鍾煎七分空心服

平夏五味而
 加烏梅葛根者
 也若原方之用
 蘘荷為引而此
 用葛根又各有
 好處予當去川
 芎葛根蘘荷而
 加黃芩以
 治骨蒸并尊古
 而法今耳
 清心涼血益氣
 寬胸開胃健脾
 坐移正友
 生薑經汗浮爽
 止汗而回用之
 者內以灸心外
 以和表也
 平正之劑可法

犀角飲子

治產後亡津液虛損時自汗出發熱困倦唇口乾燥

犀角

麥門冬

白朮

各半兩

柴胡

一兩

枳殼

楚炒

地骨皮

生地黃

當歸

人參

茯苓

黃芩

黃芩

甘草

炒各七錢

右咬咀

每服四錢入生薑二片浮麥七十粒同水煎

三合散

治產後日久虛勞發熱即四初四君子小柴胡三方合

當歸

川芎

白芍

熟地黃

白朮

白茯苓

黃芩

各一錢

人參

柴胡

各錢半

黃芩

半夏

甘草

各五分

右作一服加生薑三片紅棗一枚水煎食前服

往來寒熱

何為敗血入肺則執火脾則寒也豈以肺主氣氣不和而熱脾統血不榮而寒乎抑脾陰肺陽而自為寒熱也然思以逐瘀為主而溫涼之法有不同焉閉陰閉陽之說空難排解以敗血閉陰則寒閉陽則熱亦有解休會作之時則似瘧疾若瘀血為有形之物閉則難支而安有解發之所也愚謂血閉於陽經

郭稽中曰產後乍寒乍熱者何答曰陰陽不利敗血不散能令乍寒乍熱產後血氣虛損陰勝則乍寒陽勝則乍熱陰陽相乘則或寒或熱若因產勞傷臟腑血弱不得宣越故令敗血不散入於肺則熱入於脾則寒若誤作瘧疾治之則謬矣陰陽不和宜增損四物湯敗血不散宜奪命丹又問二者何以別之時有刺痛者敗血也但寒熱無他證者陰陽不和也增損四物湯不一皆隨病加減陳無擇評曰乍寒乍熱榮衛不和難以輕議若其敗血不散豈止入脾肺二臟耶大抵一陰閉一陽即作寒熱陰勝故寒陽勝故熱只可云敗血循經流入閉諸陰則寒閉諸陽則熱血氣與衛氣解則休遇再會而復作大調經散五積散入醋煎佳

薛氏曰產後寒熱因氣血虛弱或脾胃虧損乃不足之証經云陰

而榮衛行之不通則寒閉於陰經而榮衛行之不通則熱故必其於通而寒熱自已也又就大調經散而言行瘀於內也五積散行瘀於外也又意為外經或為寒客則肺為之病肺病則肌表於而榮衛不通則熱而肺或為冷初所傷則肥病腫病而榮衛不通則為寒故所用之方一主裏主表也如或內外俱瘀

虛則發熱陽虛則惡寒若兼大便不通凡屬氣血虛弱切不可用發表降火若寸口脉微名陽氣不足陰氣上入於陽中則惡寒須用補中益氣湯尺部脉弱名陰氣不足陽氣下陷於陰中則發熱用六味地黃丸大抵陰不足陽往從之則陽內陷而發熱陽不足陰往從之則陰上人而惡寒此陰陽不歸其分以致寒熱交爭故惡寒而發熱也常用八珍湯若病後四肢發熱或形氣倦怠此元氣未復濕熱乘之故耳宜補中益氣湯若飢熱大渴引飲目赤面紅此血虛發熱用當歸補血湯若認為實則誤矣

一產婦惡寒發熱用十全大補加炮薑治之而愈但飲食不甘肢體倦怠用補中益氣而安又飲食後犯怒惡寒發熱抽搐咬牙難俟其脉視其面色青中隱黃欲按其腹以手護之此肝木侮脾土

其家知醫以為風寒

則其熱作而
其藥多均不可
廢也。想淺之言
伏惟裁之誤矣。
指曰虎湯而言
以欲按腹于
護中虛也。以犯
怒插擗。謂用
木也。六君補中
木香調肝。以治
肝木侮土是矣。
然亦有不受補
者。又以疎肝為
急。所謂標而本
之亦有之焉。
此翁善補。然亦
認症的確。故可
用。設不的。即敗
乃事矣。慎之。
此止治常法。

飲食停滯而作用六君加木香一劑而安。

一產婦惡露發熱。余欲用八珍加炮薑治之。其家知醫以為風寒。用小柴胡湯。余曰寒熱不時乃氣血虛之不信。仍服一劑。汗出不止。譫語不絕。煩熱作渴。肢體抽搐。余用十全大補湯二劑。益甚。脉洪大重。按如無。仍以前湯加附子四劑稍緩。敷劑而安。

吳菱山治一婦人產後去血過多。食後着惱。頭疼身痛。寒熱如瘧。左手弦大微有寒邪。右手弦滑不勻。食飲痰火也。二者因虛而得。宜養正祛邪。遂以茯苓補心湯。去地黃加羌活。青皮。葱熨。三服汗出身涼。其患漸差。然後以八物湯調理。半月後全愈。一婦產後惡露未盡。瘀血入絡。又感寒邪。身熱如瘧。即以生料五積散五帖。惡露自下而寒熱除。

此宜知

冷物是病根
故諸症皆從
瘀血變怪

眩緊為寒
霍症法尤宜
如是察識

重在琥珀
豈大豆有如是
之神也

濟世編目

卷十三

三

又一婦產後惡露未盡因起抹身寒氣客於經絡乍寒乍熱脉緊而弦以葱白散二帖安

一少婦初產四日冷物傷脾胃但覺身分不快嘔逆飲食少心腹滿悶時或腹脇刺痛晨惡寒晚潮熱夜則恍惚譫語晝則抽搐頗類風狀變異多端諸醫莫測或作虛風或云血凝實熱用甘溫而行血以寒涼退實熱如此半月不効汪至見醫滿座亦踟躕診其脉弦而緊遂令按之小腹急痛知瘀血未盡也思患者大熱惡露已下未必還有餘血偶因寒涼所傷瘀血停滯下焦日久客於經絡所以變生諸證須得大調經散倍入琥珀化諸惡血成水其患方愈遂合前藥服之五日後行惡水汁許臭不可近患人覺倦病勢漸減然後以人參養榮湯數十帖月餘如初

以柴胡合四
物各三之一

氣弱其氣甘

半各用錢為

重在補氣也而

甘草半何為

亦倍之似何損

也原方有姜

末亦不可少

此亦小柴胡法

而黃芩不加陳

皮者所以益胃

除肝也如藥

川芎者所以和

血也本草以當

歸酒酒寒熱

不巳則產後寒

證正宜加之何

為不用宜思之

柴胡四物湯。治產後往來寒熱及日久虛勞微有寒熱脉沉而

數。

當歸 川芎 白芍 熟地黃各一錢 柴胡一錢

人參 黃芩 半夏 甘草各三錢

右劉每服二兩水煎服。

增損柴胡湯。治產後虛弱寒熱如瘧飲食少腹脹。

柴胡 人參 甘草 半夏炒 陳皮

川芎 白芍炒各等分

右咬咀每服八錢加生薑五片棗二枚水煎服。

增損四物湯。治產後陰陽不和乍寒乍熱如有惡露未盡停滯

胞絡亦能令人寒熱但小腹急痛為異。

按往來寒熱者
 寒往熱來熱在
 寒來也寒熱如
 瘧者寒熱有時
 也寒往熱來者
 時平寒時平熱
 也發熱增寒者
 身發熱而又惡
 寒也治各有法
 不能備錄
 此勞前三味各
 二兩何其多後
 三味各三錢何
 其非有大智
 慧者不能處此
 方治病之
 目更生能於
 危急時乎

當歸
 芍藥
 川芎
 人參
 乾薑各兩

甘草炙牛兩
 ○右改咀每服四錢加生薑三片水煎服

釋曰此方治陰陽不和乍寒乍熱之寒熱不治惡露未盡血滯
 胞絡小腹急痛之寒熱宜詳之

更生散 治產後去血過多或不止或眩暈眼暗口噤發熱增寒

人參 當歸 熟地黃薑汁炒各一兩 川芎

荆芥穗香油燈上燒過 乾薑炒黑各三錢

右剉水煎空心服○如血大下不止加龍骨赤石脂各火煨等

分每二錢同前藥調服外以五倍子末津調納臍中即止

大調經散 治產後血虛惡露未消氣為敗濁凝滯榮衛不調陰

陽相乘增寒發熱或自汗或腫滿皆氣血未平之所為也

下三味入石脂
 龍骨非血大丁
 不甚者不用
 此方重在惡露
 未消而快神之
 用或以和陰陽
 也有謂此方如
 神者功在琥珀
 大豆湯飲間也
 此方重在傷風
 三三散以柴胡
 為君盡風邪照
 入胞中則發熱
 故宜柴胡為君
 少陽氣陷入厥
 陰而寒熱如瘧
 者氣不得條達
 也故亦以柴胡
 為君旁復餘熱
 者亦為餘熱熱

大豆一兩半
炒去皮茯苓一兩
 真琥珀一錢

右為細末每服二錢濃煎烏豆紫蘇湯下

黃龍湯 治產後傷風熱入胞至寒熱如瘧及病後勞復餘熱不

解

柴胡四錢
八分
 黃芩
 人參
 甘草各二錢
八分

右作一服水煎服

小柴胡加生地黄湯 治產後往來寒熱而脈弦者少陽也

柴胡二兩
 黃芩五錢
 人參二錢
 半夏製兩
 生地黄

梔子
 枳殼楚炒各半兩
 大棗三枚

右剉加薑棗水煎服

加減烏金散 治產後寒熱似瘧此治錯雜之邪

陷也。然用柴

胡

此方以治少陽

等症似矣然以

弦脈而加生地

山板者傷寒家

以弦脈為陽也

故以柴胡為君

此方治表裡風

寒食積氣喘痰

故無不該括故

曰治雜之邪

益此方也與五

積散和為仲

若借此以治三

陰虛之有錯雜

之邪者必奏至

効語云醫意

也請嘗試之

加減法切中不

厚朴

柴胡

黃芩

麻黃

羌活

草果

半夏

各二錢

當歸

川芎

白芍

熟地

陳皮

茯苓

桔梗

各一錢五分

桂枝

蒼朮

白芷

枳殼

各一錢

甘草

九分

右剉為散分作兩服每服用水一鍾生薑三片葱三莖煎至一

鍾不拘時服有汗多當歸川芎白芍藥熟地黃有脹多厚

朴陳皮有熱多柴胡黃芩有寒多蒼朮草果桂枝有痰

多半夏桔梗茯苓有頭痛多川芎白芷羌活有瀉去枳殼

甘草不用有餘血現在腹作潮熱疼痛加三稜義木多用立

胡索八角茴香遍身痛加羌活獨活寒熱往來加黃芩柴

胡

不可不
此方雖出產寶
然其症著其
用藥皆產後
外邪乘虛傳入
之熱症也如惡
寒壯熱三夜三
五度發惡語者
即熱入血室類
也故用防獨活
根以散之口瘡
乾嘔者熱傳胸
中也故用玄參
二竹以清之
薛皮苦寒消產
後百病白飲白
銀入參遠志扶
神為邪散熱清
故用之以治因
乏也

產寶方。療產後惡寒壯熱。一夜三五度發惡語。口中生瘡。時時

乾嘔。困乏悶絕。

人參 獨活 白鮮皮 葛根 防風

青竹茹 遠志 茯苓 白朮 二兩半

玄參 三兩 竹瀝 一升

右取銀一觔。水一斗五升。煮取七升。而諸藥重者。取三升。分溫

三服。忌酒濕麵等。

知母湯。治產後寒熱。通身溫壯。脇心煩悶。

知母 三兩 芍藥 黃芩 各二兩 桂心 甘草 各一兩

右段咀。用水五升。煮取二升半。分三服。一方不用桂心。用生

地黃。

瘧疾

按黃龍湯以下皆集外感治

法至於錯雜之

邪寒熱之症亡

不備載而次第

有節綱如綱之

有綱也冬入但

知產後寒熱以

補氣為要者

其不誤盡世人

草果飲氣必

是截法柴胡四

物是調理法而

是瘧虛癰瘰

未備者蟲雜

症同

此數條俱屬溫

補六與時宜可

備而方之未備

婁氏曰產後瘧疾多由汚血挾寒熱而作大法宜柴胡四物湯調

之熱多者草果飲子寒多者生熟飲子

補遺云產後瘧疾熱多寒少者清脾飲寒多熱少者養胃湯久而

不已者七寶飲截之

薛氏曰產後瘧疾因脾胃虛弱飲食停滯或因外邪所感或鬱怒

傷脾或暑邪所伏審係飲食用六君加楂梗蒼朮藿香如外邪多

而飲食少用藿香正氣散如外邪少而飲食多人參養胃湯飲

食勞役用補中益氣湯氣血虛弱用十全大補加炮薑虛寒用六

君加薑桂元氣脫陷急加附子大凡久瘧多屬元氣虛寒益氣虛

則寒血虛則熱胃虛則惡寒陰火下流則寒熱交作或吐瀉不食

而暑邪所伏之方不誠為以治暑方也石膏也蓋發熱溫補而後先息寒涼血瘡也白虎故云耳臨症宜分別

亦有不拘此方者須因公勇怯而施如清脾飲草果飲之類是也
以氣虛故可至三十五日而使猶不燥若以日久不下之誤矣六脈不俱且平用此然非醫工

腹痛煩渴發熱譫語或手足逆冷寒戰如慄雖見百證當補其病自退若誤用清脾截瘧之類多致不起

一產婦患瘧發熱作渴胸膈脹滿遍身作痛三日不食嘔酸噯氣此是飲食所傷脾胃不能消化用六君加神麴山查四劑而不作酸乃去神麴山查又數劑而飲食進其大便不通至三十五日計進飲食七十餘碗腹始悶令用猪膽汁導而通之其糞且不甚燥一產婦患瘧久不愈百病蜂起其脉或洪大或微細或弦緊或沉伏難以名狀用六君加炮薑二十餘劑脉證稍得又用參朮煎膏佐以歸脾湯百餘劑而瘥

一產婦朝寒暮熱或不時寒熱久不愈用六君子補中益氣兼服百餘劑而尋愈一瘧用藥百餘劑世間豈有此治法此非藥之効乃病久自息耳丹溪立齋用藥多如此殊為可笑

之良者不能非
主人之事者
不用各宜省

以二糖而用
餘劑直為可笑
然病有如是亦

不得不然也不
勿以法則勿信
蓋望時事故

又贅及
此治外感風寒
而傷飲食之症

也若暑瘧服之
則自誤矣以暑
言然清暑之劑

非產後所宜亦
須防慎
所謂脾寒作瘧

也非多寒者所

草果飲子 治產後瘧疾寒熱相半者或多熱者

半夏 炮 赤茯苓 甘草 炙 草果 炮去 川芎

陳皮 白芷 錢各 青皮 白良薑 紫蘇 錢各一

乾葛 四錢

右咬咀每服三錢加生薑三片棗一枚水煎當發日侵早連服
二服無有不安者

生熟飲子 治產後瘧疾多寒者

肉豆蔻 草果仁 厚朴 生用 半夏 陳皮

甘草 大棗 核去 生薑 各等

右八味剉碎和勻一半用生一半用濕紙裹煨令香熟去紙與
生者和勻每服五錢水煎食前一服食後一服

用

雖曰久而不
已若宜截然
此方有常山
於痰瘧則司
若果虛症大
非所宜

清脾飲 治產後瘧疾熱多寒少者

人參養胃湯 治產後瘧疾寒多熱少者

七寶飲 治產後瘧疾久而不已者以此截之

方俱見胎前瘧疾

○ 蓐勞

大全云產後蓐勞者此由生產日淺血氣虛弱飲食未平復不滿
日月氣血虛羸將養失所而風冷客之風冷搏于氣血則不能溫
于肌膚使人虛乏勞倦乍卧乍起顏色憔悴食飲不消風冷邪氣
兩感於肺肺受微寒故咳嗽口乾遂覺頭昏百節疼痛榮衛受於
風邪流注臟腑須臾頻發時有盜汗寒熱如瘧背膊煩悶四肢不
舉沉重着失此則蓐勞之候也

慶勞一說總
起于產虛然
二挾外感一
由七情其症
兼內傷飲食
泄瀉與夫瘀
血未淨者皆
看之不可不
別也
大主意

贅語盡之

又曰婦人因產理不順疲極筋力憂勞思慮致合虛羸而之寒熱如瘧頭疼自汗肢體倦怠咳嗽痞逆腹中絞刺名曰慶勞

薛氏曰按前證當扶養正氣為主用六君子湯加當歸若脾肺氣虛而咳嗽口乾用補中益氣加麥門五味若因中氣虛而口乾頭暈用補中益氣加蔓荊子若肝經血虛而肢體作痛用四物參朮若因肝腎虛弱而自汗盜汗寒熱往來者用六味丸加五味子若因脾虛血弱肚腹作痛月經不調用八珍湯倍加白朮若因脾虛血燥皮膚瘙癢產用加味逍遙散大抵此證多因脾胃虛弱飲食減小以致諸經疲憊而作當補脾胃飲食一進精氣生化諸臟有所倚賴其病自愈矣仍參虛損發熱方論諸治

汪氏治一婦產未滿月因怒氣血流如水三日方止隨又勞若四

援弦大無方。則似於草矣。草屬於虛。非胡連所治。如果胡連能治。必非無力也。請詳之。即十全大補之變。所少者白朮甘草。然以茯苓為君。循腰為佐者。心腎交寒熱愈也。所謂建中者。建中土也。芍藥甘草易老為幼。甲已化土之象。加肉

肢無力。睡而汗出。日晡潮熱。口乾。五心如炙。諸醫皆用柴芩薄荷之類。其熱愈熾。診其脉弦大無力。此虛勞也。以四物湯一兩入胡黃連秦艽青蒿各半錢。數服熱退。身涼後以黃連八珍丸一料而安。

白茯苓散。治產後虛勞。頭目四肢疼痛。寒熱如瘧。

白茯苓一兩當歸一兩川芎一兩熟地黃一兩白芍一兩

黃耆一兩人參一兩桂心各半兩

右先以水三盞入猪腰一雙薑三片棗三枚煎至一盞去餘入前藥半兩煎一盞服。

黃耆建中湯。治產後諸虛不足發熱或惡寒腹痛。

黃耆炒肉桂各一兩白芍炒二兩甘草炒七錢

桂以治脉弦
虛寒腹痛加
黃芪益表氣
以防中氣之
症

此方專治氣
血虛寒所生
諸症加之飴
糖乃建中之
良法
以盜汗而用
柴前川芎以
非宜矣以咳
嗽有痰而用
黃芪又似難
用然以之爲
君而藥煎僅
用錢許何多

右劉每服五錢用薑棗水煎服日二三次虛甚加附子
當歸建中湯治產後勞傷虛羸不足腹中疼痛呼吸少氣小腹
拘急痛連腰背時自汗出不思飲食產訖直至月滿一日三服令
人身壯強健

當歸

四兩

白芍

六兩

桂心

三兩

黃耆

一兩半

右劉每服四錢加薑棗水煎入飴糖一塊再煎稍熱服○如崩
中衄血加阿膠地黃

加味佛手散治產後血虛勞倦盜汗多困少力咳嗽有痰

當歸

川芎

黃耆

蜜汁各兩

柴胡

前胡

錢半

右咬咀每服五錢水一大盞桃柳枝各三寸棗子烏梅各一枚
生薑一片煎服○如有痰不用烏梅

用藥之原
君而藥前僅

右以中每用五錢水大蓋柳柳枝各三二兩子烏梅各三二
生薑一片煎服○如有痰不用烏梅

寡之相懸也
要之產後當
以氣血為主
故用之耳惟
無邪者宜之

四物四君而去
木加芪合小柴
胡湯者是也
三方之意方得
其理之真

震勞一症總屬
氣血兩虛故主
於十全大補為
法加續斷治諸
不足婦人內漏
五味生津養神
加麥門更妙所
去三所加三又
三合也

柴胡四物湯 治產後日久虛勞而脉浮人者

方見前往來寒熱

三合散 治產後日久虛勞鍼灸服藥俱無効者

方見前發熱

雲岐熟地黃散 治產後虛勞皆由體虛氣力未壯勞復所起四

肢煩疼時發寒熱不思飲食

熟地黃 人參 白芍 白茯苓 白朮

續斷各一兩 黃耆 當歸 川芎 五味子

桂心 各七錢半

右咬咀每服四錢生薑三片棗一枚水煎服○大全方有麥門

冬七錢半○一方無桂心五味續斷有柴胡黃芩半夏各七錢

漢唐雜目 卷十三 三

按此不離四
物黃芪續斷

桂心五味而

驚甲除骨節

之勞熱栝子

潤心中之津

液牛膝除足

膝之苦沉香

通天徹地從

蓉為司命枳

殼利胸膈細

閱前後諸方

摠以補氣血

為主或溫或

清或散或散

或破血或行

氣各隨兼症

而佐使之妙

諸用者不必

膠桂五調瑟

半

黃耆九 治產後農勞寒熱進退頭目眩痛骨節痠疼氣力羸乏

黃耆

驚甲

當歸

少各一兩

川芎

白芍

桂心

續斷

牛膝

薤蓉

栝子仁

沉香

枳殼

各七錢半

五味子

熟地黄

各半兩

右為細末煉蜜丸如桐子大每服四五十丸食後粥飯下

石子湯 療產後虛羸喘之乍寒乍熱如瘧四肢疼痛面色痿黃

各曰葶勞

猪石子

一雙去脂膜四破

香豉

一方無此豉切有知母

粳米

當歸

白芍

各二兩

右咬咀分兩劑每劑用米三合煮取一小碗去滓分三服○普

石子制諸湯用以佐諸湯

兩苑白止一兩

而佐使之妙
諸用者不必

當歸

白芍各二兩

石子即猪腎
用以佐諸湯

者得本來面

目也然現忍

致似有外邪

易知母又有

內熱不可不

辯

用人參更佳

此十全大補

湯去川芎白

朮加鹽甲牛

膝竈續斷桃

仁炙炙六味

以酒尋常有

去瘀生新之

意而寄生主

產後餘疾用

濟方無白芍有人參○許仁則方無香豉有生薑二兩桂心一兩葱白止一兩

人參驚用散

治產勞皆由在產內未滿百日體中虛損血氣尚

弱失於將理或勞動作傷致成羸勞其狀虛羸年起乍臥飲食

不消時有咳嗽頭中昏痛發歇無常夜有盜汗寒熱如瘧背膊

拘急沉困在牀服此大効

黃耆

鹽甲各一兩

牛膝七錢半

人參

白茯苓

當歸

白芍

桑寄生

麥門冬去心

熟地黃

桃仁

桂心

甘草

各半兩

續斷

二錢半

右為細末每服先以猪腎一對去筋膜以水兩太盞生薑半兩棗三枚煎至一盞去猪腎薑棗然後用藥末二錢葱白三寸烏

猪腎者以酒
繫干腰故皆
借之以為補
助耳

五加皮去賊
風惡血腰脊
痛

開元錢麻油
莫解

此方較前人
參幣留散少
桃仁續斷於
煎法又少葱
白烏梅製茶
要知有腐則

悔一箇荆芥五穗煎至七分去滓空心晚合則溫服神効

胡氏牡丹散 治產後虛羸發熱白汗欲變羸勞或血氣所搏經

候不調或寒熱羸瘦

當歸 白芍 人參 五加皮

地骨皮各半兩 牡丹皮三錢 桂心 沒藥各二錢

右為細末每服二錢水酒各半盞如不飲酒只用水二盞開元

錢一枚麻油醮之同煎七分去滓通口服煎不得攪喫不得吹

黃耆煮散 治產後羸勞肌膚黃瘦面無顏色或憎寒壯熱四肢

痠疼心煩頭痛

鼈甲醋炙 黃耆一兩 牛膝七錢 當歸 白芍 熟地黄

人參 白茯苓 麥門冬去心 桑寄生 桂心 甘草炙各半兩

半分桑三枚煎至七分去石童子薑黃即下藥五錢煎至四分

兼破疾有風
則兼治風寒
則兼寒熱則
兼熱無定一
也
此不藥之藥
所謂穀肉果
菜食兼盡之
也

右爲細末每服用猪石子一對去脂膜切破先以水一盞入薑
半分棗三枚煎至七分去石子薑棗即下藥五錢更煎至四分
去滓空心晚食前溫服二滓並煎

猪腰子粥 治產後蓐勞發熱

猪腰子一箇去白膜切作柳葉片用鹽酒拌先用糯米一合入
葱椒煮粥鹽醋調和將腰子鋪盆底以熱粥蓋之如作會狀空
心服之

○虛羸

產寶云產後虛羸者皆由產後虧損血氣所致須當慎起居節飲
食六淫七情調養百日庶保無疾若中年及難產者毋論日期必
須調養平復方可涉喧否則氣血復傷虛羸之證作矣

若為氣血虛

則為本氣虛

而寒即無風

冷客之而亦

寒也治者須

知不足有餘

初感為寒久

則為熱若果

胞冷即本氣

虛熱者即血

虛

此方以中氣

元氣為主而

無並藥者必

薛氏曰前證產傷氣血者用八珍湯飲食傷胃者用四君子湯停

食傷脾者用六君子湯勞傷元氣者用補中益氣湯若噯氣覺有

藥味者此藥復傷胃也但用四君子湯徐徐少飲以調脾胃若胃

氣一健血氣自生諸證自愈矣

大全云冷勞者產則血氣勞傷臟腑虛弱而風冷名之冷搏於血

氣血氣不能溫於肌膚使人虛之疲頓致羸損不平復若久不平

復風冷入於子臟則胞臟冷使人無子

薛氏曰前證若血氣虛弱用八珍湯血氣虛寒用十全大補湯胃

氣虛弱用補中益氣湯脾氣虛弱用六君子湯命門火衰用八味

湯肝脾血虛用加味逍遙散肝脾鬱怒用加味歸脾湯

補虛湯治產後一切雜病只大補氣血為主

不足也其血氣
只用川芎又於
甘草分二
右劉加生薑二片水煎服○熱輕倍加茯苓○熱

脾胃虛而本元不足也其血藥只用川芎又於補氣中以行肝血抑血脫益氣補脾生血之良方也黃耆易芍藥者即補血湯以黃耆為君之義所謂氣能生血血不能生氣而芍藥有殺伐之性無生長之能故去之加減法妙多用酒炒助生氣也乃丹溪法

人參

白朮

黃耆

川芎

陳皮

甘草

炙二

右剉加生薑三片水煎服

○熱輕倍加茯苓熱

甚加炒黑乾姜三分

黃耆四物湯

新產不可用芍藥以其酸寒能伐生發之氣只以

黃耆易芍藥為補虛之要藥

黃耆

當歸

川芎

熟地黃

各等分

右剉每服四錢水煎服○氣虛加參朮茯苓甘草○發熱加乾

薑○自汗多者少用川芎勿用茯苓倍加蜜炙黃耆○口渴加

五味子麥門冬○腹痛者非白芍不可雖新產亦用但以酒炒

不効

十全大補湯

治產後血氣未復形體虛弱發熱惡寒不能飲食

惡寒者陽虛發熱者陰虛此六物之用也肉桂能通榮衛而利陰陽猶諸侯之命王使通兩家之好也

本草云人參黃

芪與羊肉同功

又謂羊肉補形

益有形之物若

血而參芪益氣

羊肉補形似有

懸殊焉問語

然有形生於無

形故曰形不足

者溫之以氣則

羊肉參芪二而

一者也而四味

有氣有血能補

人參

白朮

茯苓

黃耆

當歸

川芎

白芍

熟地黃

肉桂

甘草

右剉加生薑五片棗三枚水煎服

當歸羊肉湯治產後雖無疾但覺虛弱兼心腹痛即宜服之

肥羊肉

去脂

當歸

五兩

黃耆

四兩

生薑

六兩

右先以水一斗煮羊肉取汁八升後下三味煮取二升五合

為四服○若覺惡露不盡加桂三兩○惡露下多加川芎三兩

○有寒加茱萸一兩○有氣加細辛二兩○有熱加生地黃汁

二合

釋曰所加五法分兩多寡皆有意義若川芎之治惡露下多陰

中升陽也有氣之加細辛辛以散肝也餘可類推

宜明也

小黃雌雞一隻去翅足頭

白朮

熟地黃

能行故無寒亦宜明也

肝脾與木雞屬

與黃雌鷄者陽

中之陰黃者

五十之正虛後

肝虛血弱故取

以補之色之正

脾之宜也其所

配藥總以血氣

為主故曰補虛

羸也其治腹痛

全在桂心

此即十全大補

湯之變其去地

黃白米扶苓者

意恐臣欲燄氣

炎參鹿氣耳

此方與前羊肉

湯稍為表裡而

黃雌鷄湯。治產後虛羸腹痛。

小黃雌鷄

一隻去翅足頭

當歸

白朮

熟地黃

桂心

黃耆

炒各半兩

右先以水七鍾。煮鷄至三鍾。每用汁一鍾。藥四錢。煎日三服。

產寶方。治產後虛羸。不生飢肉。

黃耆

炒

當歸

白芍

炒

人參

各三分

桂心

甘草

炒

川芎

生薑

各四分

大棗

十二枚

右九味。用水七升。煮三升。分溫三服。

一方。治產後虛勞。骨節疼痛。頭痛汗不止。

黃耆

兩

當歸

人參

生薑

各三分

淡鼓

三合

猪腎

二枚

梗米

三合

薤白

三合

後四味在佳以
其能助胃氣內
通葉衛三焦外
達頭目皮毛也

夫先天之氣生
於腎後天之氣
生於脾元氣生
於三氣之先為

不可名之物其
德藏而不用是
方以人參同元
氣於無何有之

鄉以歸芪生氣
血於元氣之戶
猪腎梗米益脾
腎之氣于先後

生姜豉薤白
通神明於內外
散邪穢于天壤
週行血脉而無

宮而無病不治
以是骨瘦而疼
物易去地甚更
人參烏梅煎若

右以水一斗五升先煮猪腎取六升下諸藥煮取二升分為三服。

又方。猪腎一雙煮入葱豉作臠如常食之。

○痞悶

郭稽中曰問產後口乾痞悶者何答曰產後藥衛大虛血氣未定。食麵太早胃不能消化麵毒結聚於胃腕上熏胸中是以口乾燥渴心下痞悶醫者不識認為胸膈滯滯以藥下之萬不得一但服見睨左則愈。

釋曰為食麵者之戒南人甚少於諸飲食皆能致疾不必拘於一麵也。

陳無擇評曰產後口乾痞悶未必只因食麵或產母內積憂煩外

通補明於內外
一麵也
東無異評曰產後口乾痞悶未必只因食麵或產母內積憂煩小

所不通宜摩百
宮而諸病不治
以是骨疼頭疼
自汗諸症有邪
則散無邪則補
所謂妙用無方
隨感隨應者也
於治後虛勞
有宜識焉
隨以調治極是
但治煩以四物
去地黃尤不如
去芎芩也

傷燥熱飲食甘肥使口乾痞悶當隨其所因調之可也心煩宜四
物湯去地黃加入參烏梅煎若外傷燥熱者屬何經當隨經為治
雖以備舉飲食所傷見睨丸却龍作湯

薛氏曰前證若宿食停滯用六君枳實神麴若因肉食所致更加
山查若因魚鱸之類再加陳皮其物既消而仍痞或反作痛作嘔
此脾胃受傷用六君子湯或噯酸噯腐加炮薑作瀉更加升脉如
不應佐以四神丸或開用補中益氣湯

一婦人食角黍煩渴痞悶腹痛大便若去不去服消導之藥不應
飲食日減飢體日瘦半年矣余謂此食積為患用大酒麴炒為末
溫酒調服二錢俄而腹鳴良久仍下棕而愈

一婦人食魚肝腹痛患諸藥不應用陳皮白朮等分為末以陳

按見眼丸有

三棱莪木良

姜溫滑之味

加以人參升

以蘿蔔慢火

巧如治麴矣

而立齋純於

用補亦為膏

梁久用消導

者設也如黎

藿新病未嘗

用消導而氣

寔者豈可泥

於立齋之說

乎法當臨時

消息

蘿湯為治

麴也

稽中之言雖

泥於敗血而

皮湯送下數劑而愈

見眼丸

治產後血氣虛弱飲食停積口乾煩悶心下痞痛

薑黃

炒

萆澄茄

良薑

三棱

醋

蓬朮

醋

人參

陳皮

去白各等分

右為細末用蘿蔔慢火煮令極熟研爛取餘汁煮麴糊丸如相子大每服三五丸蘿藿湯或白湯下

腹脹

郭樞中曰產後腹滿悶嘔吐不定者何答曰敗血散於脾胃脾受之則不能運化精微而成腹脹胃受之則不能受納水穀而生吐逆醫者不識若以尋常治脹止吐藥治之病與藥不日十更傷正氣疾愈難治但服抵聖湯則愈

此方雖出產實然因具症故其

乾嘔困乏之過絕

產後惡露不止一或三五度發惡露諸口中生瘡暗時

遊醫者有不識若以尋常治脹止吐藥治之病與藥不日十更傷正
氣失愈難也但服此聖藥則愈

可不法
此方雖出產實
然因其症故其
用藥皆治產後
外和乘虛傳入
之熱症也如惡
寒壯熱一夜三
五度發惡語者
即熱入血室類
也故用防獨葛
根以散之口瘡
乾嘔者熱傳胸
中故用玄參
二竹以清之白
鮮皮苦寒治產
後百病白欬白
銀人參遠志茯
神為邪散諸積
散用之以治困
之也

產寶方 療產後惡寒壯熱一夜三五度發惡語口中生瘡時時

乾嘔困乏悶絕

人參 偶活 白鮮皮 葛根 防風

青竹茹 遠志 各一兩半 茯神 二兩 白欬 二兩半

玄參 三兩 竹瀝 一升

右取咀方觔水一斗五升煮取七升而諸藥重煮取三升分溫

三服忌魚酒濕麵等

知母湯 治產後年寒仁熱通身溫壯脇心煩悶

知母 三兩 芍藥 黃芩 各二兩 桂心 甘草 各兩

右咬咀用水五升煮取二升半分三服一方不用桂心用生

地黃

按口意龍湯以下皆集外感治

瘧疾

法至於錯雜之邪將熱之症立

婁氏曰產後瘧疾多由汚血挾寒熱而作大法宜柴胡四物湯調

不備載而次第有節真如綱之

之熱多者草果飲子寒多者生熟飲子

有綱也今人追知產後寒熱以

補遺云產後瘧疾熱多寒少者清脾飲寒多熱少者蒼胃湯久而

補氣血為毒者其不誤盡世人

不已者七寶飲截之

平草菓飲生熟飲

薛氏曰產後瘧疾因脾胃虛弱飲食停滯或因外邪所感或鬱怒

是破法柴胡四物是調理法百

傷脾或暑邪所伏審係飲食用六君加枳梗蒼朮藿香如外邪多

署瘧虛疾久虛未備者當與雜

而飲食少用霍香正氣散如外邪少而飲食多用人參養胃湯飲

症同此繁條俱屬溫

食勞役用補中益氣湯氣血虛弱用千金大補加炮薑虛寒用六

補衣與時宜可倚即勞之未備

君加薑桂元氣脫陷急加附子大凡人瘧多屬元氣虛寒蓋氣虛

則寒血虛則熱胃

虛則惡寒陰火下流則寒熱交作或吐瀉不食

丹溪云上升紫金丹治產後衝脹胸中有物狀如噎氣

家作一注

此藥係屬溫
神效宜可
君加薑桂元氣
則寒血虛則熱
胃虛則惡寒
陰八下流則寒
熱交作或此
虛不食

丹溪云上升
之氣自肝出

產後肝血虛

而肝氣盛以

是衝上作服

用代赭石鎮

子氣之上逆

也醋丸更妙

磋礪石即磨

刀石亦為肝

而設

此兼血脹

此治水法惟

有餘者可服

白治喘者因

水逆行而上

喘也水下則

喘自止矣

石剉水煎服

紫金丹 治產後衝脹胸中有物狀如噎氣

代赭石 磋礪石各等分

右為細末醋糊丸如桐子大每服三五十丸酒下胸中痛加當

歸湯下久服治血痛

又方

代赭石一兩 桃仁三錢炒 大黃半兩

右為末薄荷水打糊丸如桐子大每服三五十丸溫水下無時

白聖散 治產後腹大堅滿喘不能臥

樟柳根三兩 大戟一兩 甘遂一兩

右為極細末每服二三錢熱湯調下取大便宜利為度此主水

氣之聖藥也。此藥峻利不可輕用

○浮腫

郭稽中曰。產後四肢浮腫者。敗血乘虛停積。循經流入四肢。留淫日深。却還不得。腐壞如水。故令面黃。四肢浮腫。醫人不識。便作水氣治之。投以甘遂大戟等藥。以導其水。夫產後必虛。又以藥虛之。是謂重虛。往往多致夭枉。但服小調經散。血行腫消。則愈。

氣分者先腫而後經血不行。血分者先經血不行而後腫也。故治法不同。

陳無擇曰。產後浮腫多端。有自懷妊腫至產後不退者。亦有產後失於將理。外感寒暑風濕。內則喜怒憂驚。血與氣搏。留滯經絡。氣分血分。不可不辨。要當隨所因。脈證治之。小調經散治血分固效。但力淺難憑。不若吳茱萸湯。枳朮湯。奪魂散。大調經散。皆要藥也。又論曰。夫產後勞傷血氣。勝理虛。則為風邪所乘。邪搏於氣。不得

為水腫。氣腫者發汗即愈。水腫者利小便差也。

又論曰。夫產後勞傷血氣。勝理虛。則為風邪所乘。邪搏於氣。不得宣越。故令虛腫。輕浮是邪搏於氣。氣腫也。若皮膚如熟李狀。則寔為水腫。氣腫者發汗即愈。水腫者利小便差也。

潔古云。如產後風寒在表。面目四肢浮腫。宜局方七聖九白湯下。日加以利為度。如浮腫至膝。喘嗽加水香栝。柳倍之。謂氣多也。如浮腫又頭痛昏冒。加羌活川芎。謂風多也。如只浮腫止。七聖丸本方服。

東垣云中滿分消丸。

見腫滿門

用四物湯吞之。

丹溪云。產後腫必用大補氣血為主。少助以蒼朮茯苓。使水自利。薛氏曰。前證若寒水侮土。宜養脾肺。若氣虛浮腫。宜益脾胃。若水氣浮腫。宜補中益氣。當參雜證本門主治。

一產婦飲食少思。服消導之劑。四肢浮腫。余謂中氣不足。朝用補

以中氣虛誤服消導藥所

致故宜補上
為王金匱丸
者以補火生
土而有水鬱
折之之法存
焉

中益氣湯。用六君子湯而愈。後因怒腹脹。誤服沉香化氣丸。吐
瀉不止。飲食不進。小便不利。肚腹四肢浮腫。用金匱加減腎氣丸
而愈。

一產婦泄瀉。四肢面目浮腫。喘促惡寒。余謂脾肺虛寒。用六君加
薑湯。而泄瀉愈。用補中益氣而脾胃健。

杜氏治張宜徽侍寵。產後半月。忽患浮腫。急召產科醫治。經半月
不差。病勢轉劇。召杜治之。杜至曰。諸醫作何病。張曰。皆云水氣浮
腫。杜曰。非也。且水氣發咳嗽。小便澀是也。今愛寵小便不澀。不作
咳嗽。惟手足寒。乃血藏虛。氣塞不通。流面生浮腫。遂用益血和氣
若乃因失降
下之令

藥治之。旬日病去七八。經半月全愈。所用之藥。乃靈苑方牡丹散
也。其方云。治血臙風虛。今產科家多用此藥。治產後諸病如神。

一婦產後四肢浮腫。寒熱往來。蓋因敗血流入經絡。浸入四肢。氣

一名捐金湯者是也。性升散 見血暈

一婦產後四肢浮腫寒熱往來蓋因敗血流入經絡浸入四肢氣喘咳嗽胸膈不利口吐酸水兩脇疼痛遂用旋覆花湯微汗漸解

頻服小調經散用澤蘭便煎湯調下腫氣漸消

大調經散 治產後腫滿喘急煩渴小便不利

方見前往來寒熱

小調經散 治敗血乘虛停積流入經絡四肢浮腫

沒藥 琥珀 桂心 芍藥 當歸各錢

細辛 麝香各五分

右為細末每服五分薑汁溫酒各少許調服

毒腫皆血瘀也。以血化為

經驗方 治產後遍身青腫疼痛及產後血水疾

水蛭用此方
間便良法

此仲景方也
易老方而為
丸

此行氣法謂
之正脾者氣
也

乾漆

大麥芽各等分

右各為細末以新瓦罐子中鋪一重麥蘖一重乾漆如也填蒲
用鹽泥固濟火煨通赤放冷研為散但是產後諸疾熱酒調下
二錢

白朮湯

治心腹堅大如盤邊如旋盤水飲所作名曰氣分

枳實一兩

白朮三兩

右咬咀每服四錢水一盞煎至七分去滓溫服腹中契即當

散也

正脾散

治產後通身浮腫及治婦人大病後脾氣虛弱中滿腹

脹等症

蓬莪朮

香附子

童便

茴香

甘草

炙

陳皮

各等分

小調中湯

治產後一切浮腫

但用此藥無不效者

補脾胃行瘀
血妙在調服
法

此方以白朮
為君陳皮為
佐川芎調血
通令利水與
點丸清金

右為細末每服二錢

小調中湯。治產後一切浮腫。用此藥無不效者。

茯苓 當歸 白芍藥 陳皮 白朮 一錢

右切作一劑煎湯調後藥末

沒藥 琥珀 桂心 細辛 麝香 各五

橘皮酒。治產後肌浮。以此行氣。

橘皮為末每服二錢酒調服

丹溪方。婦人產後浮腫小便少口渴惡寒無力脉皆沉此體虛

而有濕熱之積必上中滿悶宜補中導水行氣可也

白朮 二兩 陳皮 二兩 川芎 半兩 木通 六錢 茯苓 三錢

右用水煎下與點丸二十五丸黃芩為末糊丸名與點丸亦名清金丸

蓬莪朮

香附子 破 便 茴香

甘草 炙

陳皮 各等

此方甚奇片
槩中宮有濕
痰留積致小
便不利者宜
之猶服二陳
湯能使大便
潤而小便長
也

澤蘭之性能
通瘀與利水
道同防已則
又為利水絕
藥矣

瀉肺利水之
氣劑也

此方為實熱
者設

奪魂散 治產後虛腫滿促利小便則愈

生薑 三兩 取汁 白麴 三兩 大半夏 七枚

右以生薑汁拌麴裹半夏為七餅子煨焦熟為末水調一盞小便利為效

張氏方 治產後血虛風腫水腫

澤蘭葉 防已 各等分

右為末每服二錢溫酒調下不飲者醋湯調亦可

漢防已散 治產後風虛氣壅上攻頭面浮腫 此藥虛人戒服

漢防已 猪苓 枳殼 桑白皮 各一兩 商陸 甘草 各七錢半

右為麤末每服四錢生薑三片水煎空心溫服

七聖丸 治產後風氣壅盛面目四肢浮腫涕唾稠粘咽乾口燥

肉桂 桂枝 川芎 大黃 熟地 檳榔 木香 各半

此方屬實貝類

七聖丸

治產後風氣壅盛面目四肢浮腫涕唾稠粘咽乾口燥

心脇脹滿大便秘小便赤不安

肉桂去皮

川芎

大黃酒蒸

檳榔

木香各半兩

羌活

郁李仁去皮各一兩

右為末煉蜜丸如桐子大每服十五丸食後溫湯下○山嵐瘴

氣最宜服量虛實加減○如浮腫又頭痛昏胃加羌活川芎謂

風多也○如只浮腫此用本方

本虛便是寒氣故用溫劑

加味吳茱萸湯

治婦人臟氣本虛宿挾風冷胸膈滿痛腹脇絞

刺嘔吐惡心飲食減少身而虛浮惡寒戰慄或泄瀉不止少氣

羸困及因生產臟氣暴虛邪冷內勝宿疾轉增此治風寒之劑

吳茱萸一兩半

乾薑

桂心 防風

細辛 當歸

牡丹皮

赤茯苓

半夏

桔梗

麥門冬

甘草各半兩

右為麗末。每服四錢。水煎食前熱服。

加味八物湯。治產後遍身浮腫。氣急潮熱。

人參 白茯苓 熟地黄 小懷香 白朮

川芎 當歸 白芍 香附子 柴胡

黃芩 甘草

右剉散。分作六七服。每服加生薑三片。水煎空心熱服。盡此藥

方。服調經丸。若肚痛加延胡索。乾漆。枳殼各三錢。若嘔吐

惡心。加良薑。砂仁各二錢。若手足麻痺。加肉桂一錢半。若

咳嗽。加五味子。欬冬。花仁。

加減金匱腎氣丸。治肺腎虛。腰重脚腫。小便不利。或肚腹腫脹。

四肢浮腫。或喘急痰盛。已成蠱證。其効如神。此證多因脾胃虛

夫土為防水之隄。腎為水之器。腎為胃之關。而開竅於二陰。土惡濕。腎惡燥。

土之母。主化

熟地黃 四兩酒

白茯苓 三兩

山茱萸

澤瀉

而命門之氣
藏於腎為生
土之母主化
津液以利勝
於故腎氣盛
則土旺而水
有所隄自無
泛溢之患若
火衰則氣不
化而水溢溢
則濕土卑濕
而妄行矣故
有水脹之病
此方既能益
火以生土又
能化氣以利
水此其所以
為治腫之聖
藥也若於熱
脹又非所宜

弱治失其宜元氣復傷而變證者非此藥不能救

熟地黃四兩酒拌搗膏 白茯苓三兩 山藥 山茱萸 澤瀉

牡丹皮 牛膝 車前子 官桂各一兩 附子半兩

右為末和地黃煉蜜丸如桐子大每服七八十丸空心白湯下

積聚血痕即見枕宜參看

大全云夫積者陰氣也五臟所生聚者陽氣也六腑所成皆由飲食不節寒熱不調致五臟之氣積六腑之氣聚積者痛不離其部聚者其痛無有常處所以然者積為陰氣陰性沉伏故痛不離其部聚兼陽氣陽性浮動故痛無常處產後血氣傷于臟腑臟腑虛弱為風冷所乘搏於臟腑與血氣相結故成積聚癥塊也

薛氏曰前證乃真氣虧損邪氣乘之况產後得之尤當固真氣為

似字是眼
按不痛是法
痿黃皤白浮
瘡為血虛

主若求旦夕之效而攻其邪則速其危矣當參前雜証積聚諸方論治之

一產婦腹中似有一塊或時作痛而轉動按之不痛面色痿黃痛則皤白脉浮而濇余謂此肝氣虛而血弱也不信乃用破血行氣痛益甚轉動無常又認以為血蠶專用破血馳逐之藥痛攻兩脇肚腹尤甚益信為血蠶確服下血等藥去血甚多形氣愈虛肢節間各結小核隱於肉裏以為驚子畏藥而走於外余曰肝藏血而養諸筋此因肝血復損筋涸而攣結耳蓋肢節胸項皆屬肝膽部分養其脾土補金水以滋肝血則筋自舒遂用八珍湯逍遙散歸脾湯加減調治而愈

雨物即脾厭
腐肝經小便
小腹寒執等

一婦月經失調兩物腫脹小便澀滯腹中一塊作痛或上攻脇腹

則脾也故須
不愈余謂肝脾血氣虧損用八珍湯逍遙散歸脾湯隨症互服而

症皆肝所主而飲食無味則脾也故須肝脾兼治

雖以風冷為惜提是血氣不治

此亦大槩言耳至於治法非行氣破結不可而參正和自除之至於胃氣不足攻伐太過者切宜慎焉

或下攻小腹發熱晡熱惡寒肌晡消瘦飲食無味殊類廢症久而不愈余謂肝脾血氣虧損用八珍湯逍遙散歸脾湯隨症互服而愈

大全云新產後有血與氣相搏而痛者謂之痼痼之言假也謂其痛浮假無定處也此由風有風冷血氣不治至產血下則少故致此病不急治則多成積結妨害月水輕則否澁重則不通也

薛氏曰前證乃寒邪乘客氣血壅結此因氣病而血病也當補養胃氣調和月經寬緩盡養為善難經云任脉之病男子為七疝女子為瘕聚當參前後各論治之

河間芍藥湯治產後諸積不可攻宜養陰去熱其病自安

芍藥二 黃芩 茯苓各六兩

此方若為風冷所致與夫瘀血所積者當以別治之

此以佛手散溫行

右剉散每服半兩水煎服日三

四神散治產後瘀血不消積聚作塊心腹切痛

當歸去蘆 川芎 赤芍藥 乾薑炮各

右為細末每服二錢食前同溫酒調服

一方治血瘕作痛臍下脹滿或月經不行發熱體倦

當歸二兩 芍藥炒 桂心 血竭 蒲黃炒各一兩半

玄胡索炒一兩 右為末每服二錢空心熱酒調下

桂心丸治產後血氣不散積聚成塊上攻心腹或成寒熱四肢

羸瘦煩疼

桂心 當歸 赤芍 牡丹皮 沒藥 檳榔

乾漆炒烟 青皮各七錢半 厚朴制 三稜煨 玄胡索 大黃

此三方皆以消瘀為主而此兼行氣然有輕重之分在

按瘕有形瘕無形有瘕有血病

右為細末煉蜜丸如桐子大每服三四十丸食前溫酒下

兼行氣然有
輕重之分在
大因病探擇
乾漆 炒烟 青皮 各七 厚朴 制
三稜 煨
玄胡索
大黃

按瘕有形瘕無
形有形者血病
無形者氣病故
血病則着氣病
則行今以血瘕
而痛無定所者
凡氣血俱病也
氣為瘕結上則
生火火戰瘕行
故痛無定所方
以童便生地藕
汁者亦血清火
破瘕也蓋火清
則至痛瘕破則
瘕消佐以姜汁
調以煖酒以熱
則行寒則凝故
用之以從治耳

桃仁 去皮 蟬蛻 酥炙 各一兩

右為細末煉蜜丸如桐子大每服三四十九食前溫酒下

產寶方 療血瘕痛無定處

童便 三升 生地黄汁 生藕汁 各一升 生薑汁 三升

右先煎前三味約三分減二次下薑汁慢火煎如稀飭每服取

一合煖酒調下

千金方 療血瘕

生乾地黄 兩 烏賊魚骨 二兩

右為細末空心溫酒調服二錢七

霍亂

大全云產後霍亂氣血俱傷臟腑虛損或飲食不消觸冒風論所

此方平順中有
用處可法之

霍亂暑症者
多不可輕用熱

補之臍益暑症
之氣迷結心胸

若投以溫補是
寔也今人飲

以冷水則生與
之熱飲則死者

可相矣
此以飲食稍過

即嘔吐或瀉知
其脾虛美致於

手足冷能不溫
之乎然以霍亂

愈後故可服否
則不宜也

予曰

霍亂吐瀉不

致陰陽不順清濁相干氣亂於腸胃之間真邪相搏冷熱不調上吐下痢故曰霍亂也經云渴而飲水者五苓散寒多不飲水者理

中丸大段虛冷者加附子來復丹亦妙

薛氏曰一產婦停食霍亂用霍香正氣散之類已愈後胸腹膨服

飲食稍過即嘔吐或作瀉余謂此脾胃俱虛用六君子湯加木香

治之漸愈後因飲食失調兼悲怒患霍亂胸腹大痛手足逆冷用

附子散又用八味丸以補土母而康設泥痛無補法而用辛散或

用平補之劑必致不起

一產婦吐瀉嘔酸面目浮腫此脾氣虛寒先用六君加炮薑為主

佐以越鞠丸而嘔酸愈又用補中益氣加半夏茯苓而脾胃康

四生散治一切霍亂吐瀉極效

四生散 治一切霍亂吐瀉極效

同治法亦別

為此片霍亂
正治法助安
試也盡意者
不如無害正
為此耳

用此方者當
認虛寒二字
為主

方見脂前霍亂

五苓散 治霍亂溫而飲水者

白朮炒 茯苓

猪苓錢

澤瀉二錢

桂三分

右剉作一服水煎服

理中丸 治脾胃虛寒嘔吐泄瀉飲食少息肚腹膨脹

人參 白朮炒

乾薑炮

甘草炙各一錢

右為末米糊丸如彈子大每服一丸嚼細白湯下

白朮散 治產後霍亂吐瀉腹痛煩渴手足逆冷或大便不實

白朮 橘紅

麥門冬去心

人參

乾薑煨各一兩 甘草半兩

右剉每服四錢薑水煎服

溫中散 治產後霍亂吐瀉不止

人參 白朮 當歸 草豆蔻仁 乾姜各一兩

厚朴姜製一兩半

右為麤末每服三錢水煎服

附子散 治產後霍亂不止手足逆冷

附子炮 桂心 吳茱萸炮 丁香 當歸 白朮

人參 橘紅 甘草炙各半兩

右為細末每服二錢粥飲調服

高良薑散 治產後霍亂泄利腹中疝痛

高良薑 當歸 草豆蔻仁各等分

右為細末每服一錢用粥飲調下

○右二方非真寒不可用

吐瀉用當歸者甚少而前三方皆用之亦非理之所宜也
霍亂忌粥飲此又以粥飲調非真當歸

有虛是寒暑之別焉。主治的確誠為治病良藥。

伏暑藥。伏暑暑熱之氣因時感冒伏於心胸之間以致正氣鬱悶上下不得宣通遂令悶絕而死。有如尸厥之狀所謂中脘閉結三焦不通者是也。暑月長途往來。

藿香正氣散。治外感風寒內停飲食。頭疼寒熱。或霍亂泄瀉。或作瘧疾。

藿香一錢 桔梗炒 大腹皮 紫蘇 茯苓 白木炒

白芷 半夏 陳皮 厚朴製各一錢 甘草炙五分

右剉加薑棗水煎服。

來復丹。治伏暑吐瀉。身熱脈弱。其效如神。倉卒間須用此藥。

硝石一兩同硫黃火上微炒用柳木條攪結砂子不可火大 舶上硫黃

太陰玄精石研各一兩 五靈脂去砂 青皮 陳皮各二兩

右為末。醋糊丸如小豆大。每服三十九。空心米飲下。易簡方。

云硝石性寒。佐以陳皮。其性疎快。硫黃性寒。味澁。若作煖藥。以止瀉誤矣。蓋用啖食生冷。或冒暑熱之氣。中脘閉結。撞霍變亂。

有之切不可
補宜備此藥
以濟之
以其得火土
相成之化故
能燥濕治吐
逆也
吐屬陽明故
以胃字為正
盡之

嘔吐專主脾
胃乃理之常
八味丸恐非
按急之務

非此藥不能通利三焦分理陰陽其功甚效而速

一方治吐逆不受湯藥者

伏龍肝為細末每服三錢米飲下

嘔吐

大全云夫胃為水穀之海水穀之精以為血氣榮潤臟腑因產則
臟腑傷動有時而氣獨盛者則氣乘腸胃腸胃燥澀其氣則逆故
嘔逆不下食也

薛氏曰前證若因飲食過時用四君子湯飲食過多用六君子湯
飲食過時而兼勞役用補中益氣若因飲食停滯用人參養胃湯
脾胃氣虛用六君子湯脾胃氣虛寒加炮薑木香寒水侮土用益智
散脾水侮脾土用六君升麻柴胡命門火衰不能生土用八味丸

此病肥虛生痰故以六君子為先是掩

此方不獨產後可用於雜症之有嘔吐者亦效妙在狗胆靈脂

以惡露為嘔吐人當大之此方白荷蒂紅花薄荷

嘔吐泄瀉手足傷冷或肚腹作痛乃陽氣虛寒急用附子理中湯多有生者

一產婦朝吐痰夜發熱晝夜無寐或用清痰降火肌體日瘦飲食日少前症愈甚余曰早間吐痰脾氣虛也夜間發熱肝血虛也晝夜無寐脾血耗也遂用六君子湯加味道遙散加味歸脾湯以次調理而痊

香靈丸 治產後嘔不止者

丁香 辰砂 另研各六分 五靈脂 一錢

右香脂先研後入砂再研勻用狗膽或猪膽丸如鷄頭大每服

一丸生薑陳皮湯磨下

蒲黃散 治產後三四日惡露不下嘔逆壯熱

當歸治惡露不
下生芩止嘔安

胃是矣若生地
知母芍藥能不

審乎要知此
三味又為壯熱

者設而無壯熱
其散用乎况在

三四日之間若
藥重為所忌讀

方者當知其源
此方治痰理氣

為治嘔正方前
方一寒一熱之

治瘀血者不同
當知此散

人參益胃調
平治胸滿一益

氣一散氣自與

芍藥二兩

當歸

知母

生薑

蒲黃各二兩

紅花半兩

荷葉心中蒲一個

生地黄汁一盞

右咬咀水二升煎至一升去渣下蒲黃煎數佛空心分三帖

橘紅半夏湯治產後胃虛嘔逆

橘皮一兩

半夏

甘草炙各半兩

藿香三兩

右剉每服五錢加生薑五片水煎服

開胃散治產後胃虛嘔吐胸滿不食

人參一兩

訶子半兩

甘草炙半兩

右剉每服五錢如生薑五片水煎服

薑木散治產後更無他疾但多嘔逆不能食

白朮一兩二錢半

生薑一兩半

石蓮散治產後胃寒咳逆嘔吐不食或腹作脹

平治胸滿一益
氣一散急昇
白米一兩二錢半
生薑半兩

前後諸方不同
別是一種見解

人所未知

更無他家專主

胃氣虛寒也故

惟以溫補為主

既用生薑以佐

米復加酒以為

煎法之妙也

本草若重即遵

定之沉水中于

底者也其味甘

其性降故能益

胃清水而治嘔

况如茯苓以下

氣丁香以溫寒

生薑助之其中

品味大非前方

右剉作一服酒水各二升煎取一升分二服

石蓮散治產後胃寒咳逆嘔吐不食或腹作脹

石蓮肉一兩白茯苓一兩丁香半兩

右為細末每服三錢用薑湯或米飲調下日三服

錢氏益黃散治脾自虛寒水反來侮以致嘔吐不食或肚腹作

痛或大便不實手足逆冷等症

陳皮一兩青皮一兩訶子肉甘草炙丁香各二錢

右為麤末每服四錢水煎服

加味四君子湯治產後嘔逆不已

人參白朮茯苓甘草炙半夏陳皮

藿香砂仁各等分

比奈奈何今之
所買市中存連

味極苦而內無

心形似蓮笑而

宜非連實考之

市人乃云皆是

山中木實本體

既殊性味亦異

豈有清胃和

中之理求治者

宜審擇之當防

市人之所誤

治脾虛有痰嘔

逆之正方也

以上八方各有

見解宜一考

証施治勿妄投

也

上言無冷小因

也下言表冷兩

右劉每服四錢加生薑三片棗一枚水煎溫服

吃嘔

大全云夫五臟六腑俱稟氣於胃而肺為主氣之綱司若產後效

傷氣血則臟腑氣損而風冷搏之肺因氣逆而上則吃逆矣又膈

虛氣冷胃中伏寒因食熱物冷熱相擊氣厥而不順則吃逆也膈

者主中焦為三焦之關五臟之倉廩貯積水穀若陰陽氣虛使漢

衛氣厥逆則致生斯病也經云吃噎者胃寒所生服藥無效者灸

期門三壯必愈期門穴乃胃之大絡

薛氏曰前證屬胃氣虛寒之惡候如用後方未應急投參附湯亦

有復生者

丁香散治產後心煩咳噎不止

右為綱未每服一錢煎桃仁吳茱萸湯調下如人行五里再服

丁香散 治產後心煩咳嗽不止

因也然有痰熱虛呃之不同

茲宜詳辨

期門在乳下

此治欬逆也而

何多有心煩渴

聞此方欬逆是

虛寒氣滯心煩

是敗血瘀留不

然以用桃仁同

吳萸為湯也當

識之

此治寒自胃入

而欬逆也

摩皆法極妙其

曰時時塗藥注

盡前既服之外

又以藥塗手摩

之也

治無虛中氣

丁香

白豆蔻

各半兩

伏龍肝一兩

右為網末每服一錢煎桃仁吳茱萸湯調下如人行五里再服

薑桂散

治產後欬逆三日不止欲死

肉桂

五錢

薑汁

三合

右剉同煎服三合以大火炙手摩令背熱時塗藥汁盡妙

羌活散

治吃逆

羌活

附子炮

茴香

炒各半兩

木香

白薑

炮各二錢半

右為末每服二錢水一盞鹽一捻煎十數沸熱服一服止

一方

治產後吃逆

乾柿一個切碎以水一盞煎六分熱啗

一方

治產後吃逆三五日不止

弱而又為外感
寒邪者設也妙
在用鹽
吃逆症俱用
柿蒂而此用
乾柿意自有
別
按巢上蜂窠
也

陳壁窠三五個水煎呷。即蜂子窠。

補遺治產後吃逆橘皮湯及大小橘皮湯皆效。

右諸方當審寒熱虛實用之如寒者宜丁香薑桂熱者宜乾柿
竹茹實者宜香附橘皮虛者宜人參甚則附子佐之誤施則筵
臍之悔慎之。

咳嗽

大全云肺主諸氣產後肺虛外邪易感少有微邪便成咳嗽故或
風或熱或寒或濕皆令人咳嗽也若產後喫鹽醃太早而咳嗽者
難治。

郭稽中曰產後血氣不通咳嗽者何答曰產後咳嗽多因食熱麵
壅滯或熱病或有氣塊發時衝心痛氣急咳嗽四肢寒熱心悶口

乾或時煩躁睡夢氣虛肢體無力宜

方黑神散五結散加棗

煎服

薛氏曰產後咳嗽若因陰血虛者用四物加麥冬陳皮桔梗若因肺氣傷者用四君加芎歸桔梗因陰火上炎者六味地黃丸如參朮因風寒所感者補中益氣加桔梗紫蘇若瘀血入肺發喘兼口鼻起黑氣或鼻出血者急用二味參蘇飲亦有得生者然而所患悉因胃氣不足蓋胃為五臟之根本胃氣一虛五臟失所百病生焉但患者多謂腠理不密所致殊不知經云肺屬辛金生于巳土若脾土一虛則不能生金故腠理不密外邪易感法當壯土金生腎水以制火為善若不補其虛而直治其病則誤矣

李氏曰產後咳嗽多是瘀血入肺二母散加桃仁杏仁參茯苓

此金匱散加赤芍甘草為麻黃湯也而挾苓五味又有下氣欬肺上嗽之妙善用之則五味不嫌于草麻黃嫌于太散否扇者則突虛亡之禍可冀矣用者審之此方以出症論則治風寒痰嗽而用葱豉甘桔欬花則可然以生地麥門為君而飲治多痰寒嗽則不可大概始于風寒而終

水煎其餘以意會之可也

旋覆花湯。治產後感冒風寒咳嗽喘滿痰涎壅盛鼻塞聲重有

汗者不宜服。

旋覆花 麻黃 赤芍藥 荆芥穗 前胡 茯苓

半夏麴 五味子 甘草炙 杏仁去皮尖麩炒各等分

右咬咀每服四錢生薑三片棗一枚水煎食前溫服

集驗方。療產後感冒風寒咳嗽多痰。

甘草 桔梗各一兩半 欬冬花一兩 麥門冬去心 生地黄各一兩

豆豉一兩 葱白一握

右咬咀水煎服煮取八合去滓食後分兩服

二母散。治產後惡露上攻流入肺經咳嗽不已。

子虛法者宜之
其終則異也

三母涼藥也豈
能治惡露上攻

人參補氣藥也
豈能治流入肺

經之嗽故立齋
以桃仁杏仁加

倍蓋謂瀉肺導
痰也然亦不敢

妄用
補土生金法

久嗽多痰者
此方甚良蓋

為散中能飲
問中有瀉也

嗽見不可太概
二母散
治產後惡露上攻
流入肺經咳嗽不已

知母 貝母 白茯苓 人參各二錢 桃仁去皮

杏仁去皮尖 各一錢

右㕮咀作一服水煎食後服

異功散 治脾胃虛弱飲食少思或久患咳嗽或腹滿不食而浮

氣逆等證

人參 白朮炒 白茯苓 甘草炙 陳皮各二錢

右剉一劑加薑棗水煎服

經效方 治咳嗽多痰唾粘氣急

前胡 五味子 紫苑 貝母各一兩半 桑白皮

茯苓名二兩 淡竹葉二十片

右㕮咀水二升煎取八合去滓食後分兩服

此保肺法古
菴日久款不
愈須用龜加
以百合款肺
桑皮瀉中有
補葶稟藥亦
苓瀉火乃清
降妙劑也於
結症亦佳

此真笑語也
臨症者慎之

一方 治產後咳嗽氣喘

百部根 苦楝各六分 桑白皮二十分 乾百合 赤茯苓

右咬咀水二升煮取七合去滓食後分兩服

釋曰以上六方先以散邪為第一以散中兼涼血清心為第二
清肺補氣利氣行瘀為第三補土生金為第四而第五第六一
則散而收之一則清而飲之數方之內治嗽之法初中末三治
補瀉兼該先後不紊能推廣之以治雜症之咳嗽亦無不可集
方者其藥上藥王歟

○喘急

粵氏曰產後喘極危多死也

郭稽中曰產後喉中氣急喘促者何答曰榮者血也衛者氣也榮

行肺中備行肺外林膜上下謂之榮衛因產房下損多榮血而喘
衛氣無主獨聚肺中故令喘也此名孤兒喘也食為難言古巨喘者

郭稽中曰。產後喉中氣急喘促者。何答曰。榮者血也。衛者氣也。榮行脉中。衛行脉外。相隨上下。謂之榮衛。因產所下過多。榮血暴竭。衛氣無主。獨聚肺中。故令喘也。此名孤陽絕陰。為難治。若惡露不快。敗血停凝。上薰于肺。亦令喘急。但服奪命丹。見胞衣血去喘目定。

陳無擇評曰。產後喘急。固可畏。若是敗血上薰於肺。猶可責效。奪命丹。若感風寒。或因憂思。飲食鹹冷等致。病者奪命丹未可均濟。况孤陽絕陰乎。若榮血暴絕。宜大料黃散芎藭湯。亦可救傷風寒。宜旋覆花湯。性理鬱發。宜小調經散。用桑白皮杏仁煎湯調下。傷食宜服見睨丸。五積散芎藭湯。

薛氏曰。前證若脾肺氣虛弱。用六君。桔梗。若兼外邪。更加紫蘇。若中氣虛寒。用補中益氣加炮薑肉桂。若陽氣虛脫。更加附子。若瘀

專一補似大泥

以洗浴氣喘及得煖稍寬之症。審之自宜發散而百藥不效。乃更用破血溫消之劑。命芝首是當貴在產後有餘邪也。開脉動尺寸虛者邪鬱在中不得出也。故當溫散而愈。奇為學者法。

此治敗血。

此保肺逐瘀。

血入肺。急用二味參蘇飲。

一產婦喘促。自汗手足俱冷。常以手護臍腹。此陽氣虛脫。用參附

湯四劑而愈。

浦江吳輝妻孕時足腫。七月初旬產後二日。洗浴即氣喘。但坐不

得臥者。五個月惡風得煖稍寬。兩關脉動尺寸皆虛。百藥不效。用

牡丹皮、桃仁、桂枝、茯苓、乾薑、枳實、厚朴、桑白皮、紫蘇、五味、瓜蒌仁。

煎湯服之。即寬。三服得臥。其痰如失。蓋作汚血感寒治之也。

奪命散。治產後敗血衝心。胸滿上喘。命在須臾。

方見前血暈。

二味參蘇飲。治產後血入於肺。面黑發喘。欲死者。

人參二兩
為末

蘇木二兩
搗碎

右用酒一斗。煮取汁一斗。一服。調人參末。隨時加酒服。

此治敗血
此保肺逐瘀

人參二兩
蘇木二兩

蘇木
提碎

此治風寒

旋覆花湯

治產後傷風寒喘嗽痰涎壅盛

方見前咳嗽

此治飲食

見睨丸

治產後傷風飲食而喘者

此單補

五味子湯

治產後喘促脉浮而厥

方見前痞悶

此補肺清果
虛者宜之

五味子

炒

人參

杏仁

各二錢

麥門冬

去心

陳皮

各一錢

右加生薑三片棗三枚水煎服

六君加矢笑散

治產後喘急不能臥痰與血雜湧而上此脾胃

氣虛而敗血乘之也服此立止

六君子料六錢加生薑三片水煎服調入蒲黃五靈脂各炒

按此法亦二
味蜜蘇飲之
交設非寤理
為治即敗乃
事矣妙在作
以失笑散

要訣在面青
自汗上審此
大方也宜知

即十全大補
去桂加乾姜
五味子甘草
非其見者不
龍用
川島木香九
艮

五分攪勻溫服少頃滓再煎再入蒲靈末服神效余一日庄
踵門哀懇道其妻產後數喘促不能臥痰與血交湧而上口
夜兩人扶坐經側身壅絕乞救療之無暇檢方書以意度之
新產後血氣脾胃大虛順損故虛痰壅盛而敗血乘之犀角
六君子加失笑散一服痰血俱下喘亦立止次日來謝云諸
病皆去止不能食再與參苓白朮散二帖
全愈對症之藥神効如此故特附於此

大補湯 治產後百日外面青浮腫唇口氣急有汗乃大虛之證

急宜服此

當歸頭 大川芎 大白朮 白芍藥 白茯苓 人參多

黃芪多 五味子 熟地黃 乾薑 上上 甘草少

右剉散水煎服此帖不退即加川島木香另磨入服有瀉加
訶子肉豆蔻栗殼

鼻衄

此於鼻衄中曰產後口鼻無血者乃鼻衄者何者產後血虛之故

郭稽中曰。產後口鼻黑氣起。及鼻衄者。何。荅曰。陽明者。經脉之。每起於鼻。交額中。還出頰口。交人中。左之右。右之左。產後氣虛血散。榮衛不理。散亂人於諸經。却還不得。故合口鼻黑氣起。及變鼻衄。此緣產後虛熱。變生此症。胃絕脉敗。不可治。○經驗方云。急取緋線一條。并產婦頂心髮兩條。緊繫中指節上。即止。無藥可治。亦讓厭之一端也。

直良法也。當蒲之胸中。以待不時之用。

益母童便妙治虛熱。

薛氏曰。按胃脉。俠口繞承漿。蓋鼻準。屬脾土。鼻孔屬肺金。謂胃虛肺損。氣脫血死之證。急用二味參蘇飲。加附子五錢。亦有得生者。汪古山治一婦人。產後血逆上行。鼻衄口乾。心躁舌黑。蓋因瘀血上升。遂用益母丸二丸。童便化下。鼻衄漸止。血漸通。李氏曰。此產後虛熱所致。犀角地黃湯救之。

此治虛熱亦
良熱加童便
更妙

加味參蘇飲

人參二兩

蘇木二兩

附子五錢

右剉水煎服



